



Instrucciones de Alta despues de una Ablacion

- 1. En los primeros días des pues de el procedimiento debe de tomarlo suave. Ningun esfuerzo pesado.**
- 2. Su ingle tendrá generalmente dos puntos de acceso. Es normal tener algún morado en cada punto con un poco de dolor como si se hubiera golpeado el área. Esto es normal al igual que tener una inchason del tamaño de una quarter en el area. Si el dolor se empeora y la inchason es mas grande de lo normal comuniquese con nuestra oficina inmediatamente.**
- 3. Puede tener un poco de dolor de pecho de menor importancia por lo menos una semana. Va a tener un poco de dolor al respirar profundo o al inclinar. Éste es un dolor de pecho pericardial de la ablación y no es generalmente de preocupación. Esto se resuelve dentro de una semana aunque puede ser que aumente por uno o dos días después de la ablación.**
- 4. Si desarrollas fiebres inexplicada que exceden 100 grados en caulquier momento dentro de la primera 3 semanas, necesitas contactar la oficina. Si es fiebres alrededor 99 grados es comun en el primer dia depues de la ablación.**
- 5. Es muy común tener palpitaciones después de la ablación. Estas “Palpitaciones” se describen generalmente como “sensación diferente” a la arritmia que fue tratada con la ablación. Esta sensación se resuelve generalmente entre 2-3 semanas. De vez encuando se necesita el uso de un monitor de eventos de 30 dias. 6. Debe de hacer una cita para un mes despues de la ablacion.**